

**FLUOROURACILE + ACIDO FOLINICO + OXALIPLATINO
(FOLFOX 4)
NELLE NPL DEL TRATTO GASTROENTERICO**
Versione N°3 – Giugno 2019
Prof. Emilio Bajetta

INDICAZIONE

Trattamento del tumore del colon-retto.

SCHEMA POSOLOGICO

<i>Farmaco</i>	<i>Dose (mg/m²)</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
ELOXATIN	85*	ev in 3 ore	1	14 giorni
ACIDO FOLINICO	100	ev in 2 ore	1-2	14 giorni
FLUOROURACILE	400	ev in bolo	1-2	14 giorni
FLUOROURACILE	600	ev in infusione di 22 ore	1-2	14 giorni

* Si consiglia di non superare una dose cumulativa di Eloxatin® di 1250 mg/mq.

ESAMI RICHIESTI DURANTE IL TRATTAMENTO

- Emocromo con formula leucocitaria e piastrine prima di ogni somministrazione.
- Biochimica completa ogni 3 somministrazioni.

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO

Neurotossicità periferica, neutropenia, piastrinopenia, nausea, vomito, diarrea, hand-foot sindrome, mucosite. Somministrare LOPERAMIDE secondo le seguenti modalità: 2 compresse dopo la prima scarica. Continuare con 1 compressa ad ogni scarica successiva (Max. 8 cp/die)

RIDUZIONE DEL DOSAGGIO PER EFFETTI COLLATERALI

In presenza di effetti collaterali la prosecuzione del trattamento dovrà avvenire solo dopo recupero completo. La riduzione di dosaggio in caso di comparsa di uno o più dei seguenti segni/sintomi (gravità classificata sec. NCI-CTC): diarrea, vomito, neutropenia e piastrinopenia avverrà secondo il seguente schema:

- 75% dopo il 2° episodio di grado 2
o 1° episodio di grado 3
- 50% dopo il 3° episodio di grado 2
o 2° episodio di grado 3
o 1° episodio di grado 4

La riduzione del dosaggio deve essere consensuale per ELOXATIN® e fluorouracile- acido folinico. In caso di neurotossicità si potrà considerare riduzione del dosaggio solo di ELOXATIN®.

BIBLIOGRAFIA

- 1) De Gramont et al.: "Leucovorin and Fluorouracil with or without Oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer." J.C.O. 18:2938-2947,2000.
- 2) J. Souglakos et al.: "Final result of first line treatment with 5-fluorouracil(5-FU), leucovorin (LV) and oxaliplatin (L-OHP) in advanced colorectal cancer (ACC): a multicentre phase II study." Ann. Oncol. 11:suppl.4:49,2000.
- 3) P. Salinas et al.: "Analysis of bi-weekly oxaliplatin+ folinic acid (FA)+ 5-Fluorouracil (5FU) in metastatic gastrointestinal (GI) carcinoma." Ann. Oncol. 11:suppl. 4:50,2000.