



**TRATTAMENTO CON DOCETAXEL + CISPLATINO + FLUOROURACILE (TPF)  
NELLA NEOPLASIA DEL TESTA-COLLO**

Versione N°0 del 01.06.2016

**INDICAZIONE:** trattamento medico di neoplasie del distretto del testa-collo localmente avanzate / metastatiche

**SCHEMA POSOLOGICO:**

<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Somministrazione</i>	<i>Giorno</i>	<i>Riciclo</i>
<b>Docetaxel</b>	75 mg/mq	ev	die 1	21 die
<b>Cisplatino</b>	100 mg/mq	ev	die 1	21 die
<b>5-FU i.c.</b>	1000 mg/mq	ev	die 1→4	21 die

**SOMMINISTRAZIONE**

**Docetaxel** : infusione intravenosa di 60 minuti

**Cisplatino:** in 250 ml di soluzione fisiologica in 30 minuti, previa idratazione con 1000 ml di soluzione III con 20 mEq MgSO<sub>4</sub> e seguita da 1500 ml di soluzione RK. Non superare la velocità di infusione di 500 ml/ora. Monitorare diuresi: mse diuresi < 400 ml dopo le prime 4 ore dall'inizio del trattamento, somministrare Lasix 1 fiala endovena.

**5-Fluorouracile:** endovena in infusione continua di 3 settimane attraverso pompa elastomero previo impianto di CVC

**Tp. Antiemetica** : Akynzeo + Desametasone al Die 1 + Desametasone nei giorni successivi (Ex: 4 mg x 2 die 2 →4)

**ESAMI CONSIGLIATI PRIMA DEL RICICLO DELLA CHEMIOTERAPIA**

Emocromo con formula leucocitaria e conta piastrinica

Funzionalità renale (azotemia, creatininemia, clearance della creatinina)

Funzionalità epatica (AST, ALT, bilirubinemia)

**EFFETTI COLLATERALI**

Vomito, nausea, diarrea, mucosite, alopecia, neutropenia, piastrinopenia, alterazione della creatininemia e dell'azotemia, ipomagnesiemia, sindrome mano-piede e neuropatia periferica.



**Istituto  
di Oncologia**

Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione

---

***Bibliografia***

*Posner M et al. J.Clin.Oncol. 19:1096-1104, 2001.*